

*** Cânceres cutâneos: comparação entre dois métodos terapêuticos (criocirurgia e cirurgia convencional).** Edna Freitas Martins(*); Lindomar F. Souza(*); Cinthia Mara de Queiroz(*); João Bosco L. Botelho(**); Alcidarta dos Reis Gadelha(***); Orlando Rodrigues de Oliveira(***). Universidade do Amazonas.

Com o objetivo de avaliar a eficácia e a eficiência da criocirurgia, assim como comparar os resultados obtidos com a cirurgia convencional em relação ao custo, tempo de execução e percentual de recidivas, foram estudados 84 pacientes com um total de 146 lesões malignas (carcinomas basocelular, espinocelular e de glândula sebácea), no período de Janeiro/1992 a Abril/1994. Dos grupos de 28 e 25 lesões foram submetidos ao primeiro e ao segundo tratamento para comparação dos resultados.

Conclusões

1 - No momento, não é possível determinar o percentual de recidiva das lesões tratadas pela criocirurgia e cirurgia convencional devido ao pouco tempo de observação pós-terapêutica, assim como as dificuldades do pareamento das lesões tratadas pelos dois grupos ao que se refere a localização, tamanho e tipo histológico.

2 - O tempo médio gasto para a realização de cirurgia convencional em uma lesão foi 4,5 vezes superior ao da criocirurgia.

3 - Pela tabela da AMB, o custo médio de tratamento de uma lesão pela cirurgia foi 1,27 maior que o da criocirurgia.

(*) Bolsista de Iniciação Científica

(**) Orientador

(***) Colaborador