

*** Odonatas da coleção de invertebrados do INPA Manaus-Am.
Mara das Dores Ferro Barreto(*); Hugo Mesquita(**).
Entomologia\INPA.**

Para instituições envolvidas com estudos Zoológicos, é fundamental poder contar com o apoio de uma Coleção Científica bem organizada e representativa. A Coleção de Odonata do INPA apresenta 11 das 13 famílias conhecidas para a região norte do Brasil. Foram feitos levantamentos da bibliografia taxonômica, separação do material, verificação do estado de conservação e identificação a nível de família e gênero. A seguir estão relacionadas as famílias encontradas a Coleção (% por nº de exemplares) e seus respectivos gêneros mais freqüentes: Aeshinidae 4%, Gynacantha; Gomphidae 5%, Phillogomphoides; Libellulidae 40%, Erythrodiplax; Agrionidae 4%, Hetaerina; Coenagrionidae 24%, Argia; Dictyostelidae 2%, Dictyostelium; Polythoridae 5%, Chalcopteryx; Protoneuridae 8%; Protoneura; Pseudostigmatidae 5% Microstigma; Megapodagrionidae 2%, Heteragrion; Lestidae 2% Lestes. Estes dados quando comparados aos da Coleção do INPA está mais próxima de representar a ordem Odonata na região amazônica.

(*) Bolsista de Iniciação Científica

(**) Orientador